

くすりのしおり

内服剤  
2018年11月作成

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出しが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:	フィナステリド錠0.2mg「SKI」	錠剤 写真
主成分:	フィナステリド(Finasteride)	
剤形:	うすい赤色の錠剤、直径7.1mm、厚さ3.4mm	
シート記載:	(表)フィナステリド0.2mg「SKI」、フィナステリド、SKI、0.2mg (裏)FINASTERIDE 0.2mg「SKI」、フィナステリド0.2mg、男性 成人のみ服用のこと、この薬を割らないこと、	
この薬の作用と効果について		
5α還元酵素II型を抑制し、テストステロンからジヒドロテストステロンへの変換を阻害して、男性型脱毛の進行遅延作用を示します。 通常、男性における男性型脱毛症の進行遅延に用いられます。		
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。		
<ul style="list-style-type: none"><li>以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。前立腺がん検診(PSA検査)を受ける予定がある。</li><li>妊娠または授乳中、妊娠している可能性がある。</li><li>他に薬などを正在使用中(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください)。</li></ul>		
用法・用量(この薬の使い方)		
<p>あなたの用法・用量は &lt;&lt; <span style="float: right;">[医療担当者記入]</span>&gt;&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>通常、成人は1回主成分として0.2mgを1日1回服用します。年齢・症状により適宜増量されますが、1日1mgが、上限です。本剤は1錠中に主成分1mgを含有します。必ず指示された服用方法に従ってください。</li><li>飲み忘れた場合は、気がついた時にその日の分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。</li><li>誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。</li><li>医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。</li></ul>		
生活上の注意		
<ul style="list-style-type: none"><li>分割・粉碎しないでください。[本剤の薬理作用(ジヒドロテストステロン低下作用)により、男子胎児の生殖器官などの正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。]</li></ul>		
この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用)		
<p>主な副作用として、性欲減退、陰茎の勃起力が弱くなるなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。</p> <p>まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。</p> <p>このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>食欲不振、全身倦怠感、皮膚や粘膜が黄色くなる [肝機能障害]</li></ul> <p>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</p>		
保管方法 その他		
<ul style="list-style-type: none"><li>乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。</li><li>薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。</li></ul>		
医療担当者記入欄 年 月 日		

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。